

【子宮・卵巣がんレジメン】						
	レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1	子宮肉腫-婦007;DG療法_		軽度催吐性リスク	8	21	ゲムシタビン点滴静注 :900mg/㎡ Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注液:100mg/㎡ Day8
2	体/卵-婦010;weeklyPTX(80mg/㎡)療法_		軽度催吐性リスク	15	28	パクリタセル注:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15
3	体-婦001;AP(ADM+CDDP)療法_		高度催吐性リスク	1	21	シスプラチン点滴静注:50mg/㎡ Day1 ドキシルシ塩酸塩注:60mg/㎡ Day1
4	卵-婦004;CPT-11+MMC療法		中等度催吐性リスク	15	28	イリノテカン点滴静注液:120mg/㎡ Day1 Day15 マイトマイシン:7mg/㎡ Day1 マイトマイシン:7mg/㎡ Day15
5	卵-婦005;CPT-11療法		中等度催吐性リスク	15	28	イリノテカン点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15
6	卵-婦011;トボテカン療法		軽度催吐性リスク	5	21	ハイカムチン注射用:1.5mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
7	卵-婦012;BiweeklyPTX(80mg/㎡)療法_		軽度催吐性リスク	1	14	パクリタセル注:80mg/㎡ Day1
8	卵-婦013;【7日設定】GEM療法_	7日設定//1コース28日（3投1休）★コース要チェック★ ※がん化学療法後に増悪した卵巣癌	軽度催吐性リスク	1	7	ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/㎡ Day1
9	卵-婦015;weeklyPTX + Bmab療法_		軽度催吐性リスク	22	28	アバスチン点滴静注用:10mg/kg Day1 Day15 パクリタセル注 :80mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22
10	卵-婦017; P L D 療法		軽度催吐性リスク	1	28	ドキシル注:50mg/㎡ Day1
11	絨毛-婦008;MTX療法		最小度催吐性リスク	5	14	メントレキセート注:0.4mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
12	胚-婦014;BEP療法	※BLMは最小度催吐性リスク。	高度催吐性リスク	15	21	ブレオ注射用:30mg Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注:20mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
13	頸/体/卵-婦009;TC療法_		中等度催吐性リスク	1	21	パクリタセル注:180mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
14	頸/卵-婦006;DC療法		中等度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注液:60mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
15	頸/卵-婦018;TC + Bmab療法_		中等度催吐性リスク	1	21	アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1 パクリタセル注:180mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
16	頸/卵-婦人019;Bmab(15mg/kg) 療法	※TC+Bmab療法後、7～22クール	最小度催吐性リスク	1	21	アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
17	頸-婦002;CCRT(CDDP+RT)療法	7日毎(放射線治療と同時に開始し5-6回投与)	高度催吐性リスク	1	7	シスプラチン点滴静注:40mg/㎡ Day1
18	頸-婦003;CDDP+CPT-11療法		高度催吐性リスク	15	28	シスプラチン点滴静注:60mg/㎡ Day1 イリノテカン点滴静注液:60mg/㎡ Day1 Day8 Day15
19	頸-婦016;TP(PTX+CDDP)療法_		高度催吐性リスク	2	21	パクリタセル注:135mg/㎡ Day1 シスプラチン点滴静注:50mg/㎡ Day2
20	子宮肉腫-婦020;DG療法_(アルコール不耐用)		軽度催吐性リスク	8	21	ゲムシタビン点滴静注液 :900mg/㎡ Day1 Day8 タキテル注:100mg/㎡ Day8