

【食道がんレジメン】

	レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1	食道-外006；FP+RT療法		高度催吐性リスク	4	28	シスプラチン点滴静注:75mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:1000mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4
2	食道-外015;mDCF療法_		高度催吐性リスク	5	21	ドセタキセル点滴静注液:60mg/㎡ Day1 シスプラチン点滴静注:6mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注:350mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
3	食道-外095;DTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注液:70mg/㎡ Day1
4	食道-外096;DTX療法(アルコール禁用)		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル注 (ドセタセル) :70mg/㎡ Day1
5	食道-外114；FP(5FU800+CDDP80)療法	※術前は21日毎2コース//術後、 切除不能・再発は28日毎が目安	高度催吐性リスク	5	21	フルオロウラシル注:800mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1
6	食道-外121;weeklyPTX療法_		軽度催吐性リスク	36	49	パクリタセル注:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
7	食道-外134；DCF(DTX70+CDDP70+5FU750)療法	※術前は21日毎2コース//術後、 切除不能・再発は28日毎が目安	高度催吐性リスク	5	21	ドセタキセル点滴静注液:70mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:750mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注:70mg/㎡ Day1