

【肺がん・胸腺がんレジメン】						
	レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1	胸腺-外097;CAP療法		高度催吐性リスク	1	21	ド`キルビ`シ塩酸塩注射液:50mg/㎡ Day1 エンドキサン注:500mg/㎡ Day1 シスプラチン点滴静注:50mg/㎡ Day1
2	胸腺-内026;CBDCA(AUC6) + PTX療法_		中等度催吐性リスク	1	21	パクリタセル注:200mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1
3	肺-外001;CBDCA(AUC6)+PTX+Bmab療法_		中等度催吐性リスク	1	21	カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1 パクリタセル注 :200mg/㎡ Day1 ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1
4	肺-外002;CBDCA(AUC5) + GEM療法_		中等度催吐性リスク	8	21	ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/㎡ Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
5	肺-外008;CBDCA(AUC5)+PEM療法	※葉酸とVitB12の投与を確認	中等度催吐性リスク	1	21	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
6	肺-外055;BiweeklyCBDCA(AUC3)+PTX療法_		中等度催吐性リスク	15	28	カルボプラチン点滴静注液:AUC=3 Day1 Day15 パクリタセル注:120mg/㎡ Day1 Day15
7	肺-外065;NP(CDDP + VNR)療法		高度催吐性リスク	8	21	シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1 ロゼウス静注用:25mg/㎡ Day1 Day8
8	肺-外066;weeklyCBDCA (AUC2)+PTX+RT療法_	day1,8,15,22,29,36投与,休薬完了day63,放射線（60Gy/30回）終了後3週間の休薬	中等度催吐性リスク	1	7	カルボプラチン点滴静注液:AUC=2 Day1 パクリタセル注:40mg/㎡ Day1
9	肺-外067;weeklyVNR療法		最小度催吐性リスク	1	7	ロゼウス静注用:25mg/㎡ Day1
10	肺-外068;IP(CDDP;60mg/㎡+CPT-11;60mg/㎡)療法		高度催吐性リスク	15	28	イリノテカン点滴静注液:60mg/㎡ Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注:60mg/㎡ Day1
11	肺-外078;Bmab(15mg/kg) 維持療法	※維持療法で用いる	最小度催吐性リスク	1	21	ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1
12	肺-外079;VNR+Bmab(15mg/kg) 療法		最小度催吐性リスク	8	21	ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1 ロゼウス静注用:25mg/㎡ Day1 Day8
13	肺-外090;GEM療法_		軽度催吐性リスク	15	28	ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/㎡ Day1 Day8 Day15
14	肺-外108;DTX療法(アルコール禁用)		軽度催吐性リスク	1	21	タキソール注（ド`セタセル） :60mg/㎡ Day1
15	肺-内001;AMR療法	※注射でDEX3日間行くので、経口DEXは省略。	中等度催吐性リスク	3	28	カルセド注射:40mg/㎡ Day1 Day2 Day3
16	肺-内003;BiweeklyCBDCA(AUC3) + GEM療法_		中等度催吐性リスク	1	14	ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=3 Day1
17	肺-内004;CBDCA(AUC6) + PTX療法_		中等度催吐性リスク	1	21	パクリタセル注:200mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1
18	肺-内005;CBDCA(AUC5) + S-1療法		中等度催吐性リスク	1	21	カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1 S-1: 2 × 朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
19	肺-内006;CBDCA(AUC5) + VP-16療法		中等度催吐性リスク	3	21	エト`シド`点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
20	肺-内007;PEM療法	※葉酸とVitB12の投与を確認	軽度催吐性リスク	1	21	ペメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1

21	肺-内008;CBDCA(AUC5)+PEM療法	※葉酸とVitB12の投与を確認	中等度催吐性リスク	1	21	ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
22	肺-内009;CBDCA(AUC6)+PEM+Bmab療法	※葉酸とVitB12の投与を確認	中等度催吐性リスク	1	21	ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1
23	肺-内012;weeklyPTX療法_		軽度催吐性リスク	15	28	パ`クリタセル注:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15
24	肺-内013;ハイカムチン療法		軽度催吐性リスク	5	21	ハイカムチン注射用 1.1mg/V:1mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
25	肺-内015;CPT-11療法		中等度催吐性リスク	15	28	イリノテカン点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15
26	肺-内016;DTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注液:60mg/㎡ Day1
27	肺-内017;VNR療法(2投1休)		最小度催吐性リスク	8	21	ロゼウス静注用（レジメン用 規格なし）:25mg/㎡ Day1 Day8
28	肺-内019;RAM+DTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注液:60mg/㎡ Day1 サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1
29	肺-内020;ニボルマブ療法		最小度催吐性リスク	1	14	オプジーボ`点滴静注:240mg Day1
30	肺-内021;CDDP+VP-16療法		高度催吐性リスク	1	21	シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1 エトポシド`点滴静注液 :100mg/㎡ Day1 Day2 Day3
31	肺-内022;CBDCA(AUC6)+nab-PTX療法		中等度催吐性リスク	15	21	ア`ラキサン点滴静注用:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1
32	肺-内023;ベムプロリズマブ療法		最小度催吐性リスク	1	21	キイトルーダ`点滴静注100mg4mL:200mg Day1
33	肺-内024;weekly nab-PTX療法		軽度催吐性リスク	1	7	ア`ラキサン点滴静注用:100mg/㎡ Day1
34	肺-内025;デュルバルマブ療法		最小度催吐性リスク	1	14	イミフィンジ点滴静注用:10mg/kg Day1
35	肺-内026;パ`ム7`ロクス`マ7`+CBDCA(AUC5)+PEM療法	※葉酸とVitB12の投与を確認	中等度催吐性リスク	1	21	キイトルーダ`点滴静注:200mg Day1 ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
36	肺-内027;パ`ム7`ロクス`マ7`+PEM療法	※葉酸とVitB12の投与を確認	軽度催吐性リスク	1	21	キイトルーダ`点滴静注:200mg Day1 ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1
37	肺-内028;パ`ム7`ロクス`マ7`+CBDCA(AUC6)+PTX療法_		中等度催吐性リスク	1	21	パ`クリタセル注:200mg/㎡ Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1 キイトルーダ`点滴静注:200mg Day1
38	肺-内029;パ`ム7`ロクス`マ7`+CBDCA(AUC6)+nab-PTX療法		中等度催吐性リスク	15	21	カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1 ア`ラキサン点滴静注用:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15 キイトルーダ`点滴静注:200mg Day1
39	肺-内030;PEM+Bmab療法	※葉酸とVitB12の投与を確認	軽度催吐性リスク	1	21	ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1
40	肺-内031;アテゾリズマブ+CBDCA(AUC5)+VP-16療法		中等度催吐性リスク	3	21	テセントリク点滴静注:1200mg Day1 エトポシド`点滴静注液 :100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1

41	肺-内032;アテゾリズマブ療法		最小度催吐性リスク	1	21	テセントリク点滴静注:1200mg Day1
42	肺-内033;CDDP + PEM療法	※葉酸とVitB12の投与を確認 ※最大 6 コース	高度度催吐性リスク	1	21	ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/㎡ Day1
43	肺-内034;ペムブロリズマブ(6週間間隔)療法		最小度催吐性リスク	1	42	キイトルダ点滴静注100mg4mL:400mg Day1
44	肺-内038;ニボルマブ+イピリムマブ療法	※ニボルマブ+イピリムマブ + 化学療法(6週毎)1コース終了 後に開始	最小度催吐性リスク	22	42	オプジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22 ヤーポイ点滴静注液:1mg/kg Day1
45	肺-内040;RAM(10mg/kg)+エルロチニブ療法		最小度催吐性リスク	1	14	サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1 タルセバ錠 1日1回 (連日内服)

※PEM投与時
①パンピタン末 1g 1 × (初回投与 1 週間前から開始。PEM
中止または終了する場合には、最終投与から22日目まで投
与。)
②VitB12 (初回投与 1 週間前までに1mgを筋肉内投与。以
後 9 週ごとに投与。)