

【腎・尿路上皮・膀胱・精巣・前立腺・陰茎がんレジメン】

レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1 陰茎-泌015 ; FP(5FU800+CDDP80)療法		高度催吐性リスク	4	28	シスプラチン点滴静注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:800mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4
2 陰茎-泌016;TIP療法		高度催吐性リスク	4	21	パクリタキセル注:175mg/m <sup>2</sup> Day1 イホマイド注 :1200mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注:25mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4
3 腎-泌004;テムシロリムス（トーリセル）療法		最少度催吐性リスク	1	7	トーリセル点滴静注液:25mg Day1
4 腎-泌012;ニボルマブ療法		最少度催吐性リスク	1	14	オブジーボ点滴静注:240mg Day1
5 精巣-泌007;BEP療法	※BLMは最少度催吐性リスク。 ★FN High Risk	高度催吐性リスク	16	21	シスプラチン点滴静注:20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボソチド点滴静注液 :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブレオ注射用:30mg Day2 Day9 Day16
6 精巣-泌008;VIP療法	★FN High Risk	高度催吐性リスク	5	21	エトボソチド点滴静注液:75mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注:20mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド注 1 g /V:1200mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
7 精巣-泌009;CPT-11(200mg/m <sup>2</sup> )+NDP療法		中等度催吐性リスク	1	28	アブラ静注用:100mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカンド点滴静注液:200mg/m <sup>2</sup> Day1
8 精巣-泌010;CPT-11(300mg/m <sup>2</sup> )+NDP療法	★初回、Grade3以上の有害事象を認めなかった場合に使用を考慮。	中等度催吐性リスク	1	28	アブラ静注用:100mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカンド点滴静注液:300mg/m <sup>2</sup> Day1
9 前立-泌001;DTX(60mg/m <sup>2</sup> )療法		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注液:60mg/m <sup>2</sup> Day1 プレドニン錠10mg ※連日投与
10 前立-泌005;CBZ(20mg/m <sup>2</sup> )+PSL療法		軽度催吐性リスク	1	28	ジエプタキセル点滴静注:20mg/m <sup>2</sup> Day1 プレドニン錠10mg ※連日投与
11 前立-泌011;CBDCA (AUC5) +PTX+EP療法		中等度催吐性リスク	1	28	カルボプラチント点滴静注液:AUC= 5 Day1 パクリタキセル注:175mg/m <sup>2</sup> Day1 エストラサイトカプセル156.7mg 4 Cap 2 ×朝夕食後 ※連日投与
12 尿路上皮-泌013;GN療法	中等度催吐性リスク(アロキシ使用) ★対象疾患；腎孟癌、尿管癌、膀胱癌、腎盂扁平上皮癌	中等度催吐性リスク	8	21	アブラ静注用:80mg/m <sup>2</sup> Day1 ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8
13 尿路上皮-泌014;ペムプロリズマブ療法		最少度催吐性リスク	1	21	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1
14 膀胱-泌002;splitGC(GEM + CDDP)療法_		高度催吐性リスク	15	28	ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注:35mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3
15 膀胱-泌003;GP(GEM + PTX)療法_		軽度催吐性リスク	8	21	ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 パクリタキセル注:175mg/m <sup>2</sup> Day1
16 膀胱-泌006 ; GCarbo(GEM + CBDCA(AUC4))療法_	※腎機能障害のある尿路上皮癌	中等度催吐性リスク	8	21	ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 カルボプラチント点滴静注液:AUC=4 Day1