

【胆道がん・膵臓がんレジメン】

	レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1	胆道-外007;GC(GEM+CCDP)療法_		中等度催吐性リスク	8	21	シスプラチン点滴静注:25mg/m ² Day1 Day8 ゲムシチン点滴静注:1000mg/m ² Day1 Day8
2	胆道-外043;GEM療法_		軽度催吐性リスク	15	28	ゲムシチン点滴静注:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
3	胆道-外045;GS療法_		中等度催吐性リスク	8	21	ゲムシチン点滴静注:1000mg/m ² Day1 Day8 S-1: 2 × 朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
4	膵-外005;FOLFIRINOX療法_		高度催吐性リスク	1	14	レボレチナート点滴静注:200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注:85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注:180mg/m ² Day1
5	膵-外044;GEM療法_		軽度催吐性リスク	15	28	ゲムシチン点滴静注:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
6	膵-外046;GS療法_		中等度催吐性リスク	8	21	ゲムシチン点滴静注:1000mg/m ² Day1 Day8 S-1: 2 × 朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
7	膵-外064;nab-PTX+GEM療法_		中等度催吐性リスク	15	28	ゲムシチン点滴静注:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 ナブパクリタキセル点滴静注:125mg/m ² Day1 Day8 Day15
8	膵-外124;mFOLFIRINOX療法_		高度催吐性リスク	1	14	レボレチナート点滴静注:200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注:85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注:150mg/m ² Day1
9	膵-外125;【未稍】 mFOLFIRINOX療法_		高度催吐性リスク	1	14	レボレチナート点滴静注:200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注:85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注:150mg/m ² Day1