

【子宮・卵巣がんレジメン】

レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1 子宮肉腫-婦007;DG療法_		軽度催吐性リスク	8	21	ゲムタビ`ン点滴静注液:900mg/m ² Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注液:100mg/m ² Day8
2 体/卵-婦010;weeklyPTX(80mg/m ²)療法_		軽度催吐性リスク	15	28	パ`クリケ`注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15
3 体-婦001;AP(ADM+CDDP)療法_		高度催吐性リスク	1	21	シス`ラチン点滴静注液:50mg/m ² Day1 ド`キル`シ`塩酸塩注:60mg/m ² Day1
4 卵-婦004;CPT-11+MMC療法		中等度催吐性リスク	15	28	イリノ`テカン点滴静注液:120mg/m ² Day1 Day15 マイトマイシン:7mg/m ² Day1 マイトマイシン:7mg/m ² Day15
5 卵-婦005;CPT-11療法		中等度催吐性リスク	15	28	イリノ`テカン点滴静注液:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
6 卵-婦011;トポテカン療法		軽度催吐性リスク	5	21	ハイカムチン注射用:1.5mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
7 卵-婦012;BiweeklyPTX(80mg/m ²)療法_		軽度催吐性リスク	1	14	パ`クリケ`注:80mg/m ² Day1
8 卵-婦013;【7日設定】GEM療法_	7日設定//1コース28日(3投1休)★コース要`チェック★ ※がん化学療法後に増悪した卵巣癌	軽度催吐性リスク	1	7	ゲムタビ`ン点滴静注液:1000mg/m ² Day1
9 卵-婦015;weeklyPTX+Bmab療法_		軽度催吐性リスク	22	28	アバステン点滴静注用:10mg/kg Day1 Day15 パ`クリケ`注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
10 卵-婦017;P L D療法		軽度催吐性リスク	1	28	ドキンル注:50mg/m ² Day1
11 絨毛-婦008;MTX療法		最少度催吐性リスク	5	14	メソトレキセート注:0.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
12 胚-婦014;BEP療法	※BLMは最少度催吐性リスク。	高度催吐性リスク	15	21	ブレオ注射用:30mg Day1 Day8 Day15 シス`ラチン点滴静注液:20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エト`ポ`ド`点滴静注液:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
13 頸/体/卵-婦009;TC療法_		中等度催吐性リスク	1	21	パ`クリケ`注:180mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
14 頸/卵-婦006;DC療法		中等度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注液:60mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
15 頸/卵-婦018;TC+Bmab療法_		中等度催吐性リスク	1	21	アバステン点滴静注用:15mg/kg Day1 パ`クリケ`注:180mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
16 頸/卵-婦人019;Bmab(15mg/kg)療法	※TC+Bmab療法後、7~22クール	最少度催吐性リスク	1	21	アバステン点滴静注用:15mg/kg Day1
17 頸-婦002;CCRT(CDDP+RT)療法	7日毎(放射線治療と同時に開始し5-6回投与)	高度催吐性リスク	1	7	シス`ラチン点滴静注液:40mg/m ² Day1
18 頸-婦003;CDDP+CPT-11療法		高度催吐性リスク	15	28	シス`ラチン点滴静注液:60mg/m ² Day1 イリノ`テカン点滴静注液:60mg/m ² Day1 Day8 Day15
19 頸-婦016;TP(PTX+CDDP)療法_		高度催吐性リスク	2	21	パ`クリケ`注:135mg/m ² Day1 シス`ラチン点滴静注液:50mg/m ² Day2