

【胃がんレジメン】						
	レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1	胃-外009;weeklyPTX療法_		軽度催吐性リスク	15	28	パクリタセル注:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15
2	胃-外012;SP(S-1+CDDP)療法		高度催吐性リスク	8	35	シスプラチン点滴静注:60mg/㎡ Day8 S-1: 2 × 朝夕食後 21日分（day1朝食後～day21夕食後）
3	胃-外014;XP(Cape.+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1 カベシタビン錠（2000mg/㎡/日）: 2 × 朝夕食後 14日分 （day1夕食後～day15朝食後）
4	胃-外038 ; CDDP(70mg/㎡)+CPT-11(80mg/㎡)療法		高度催吐性リスク	15	28	イリノテカン点滴静注液:70mg/㎡ Day1 シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1 イリノテカン点滴静注液:60mg/㎡ Day15
5	胃-外040;DTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注液:60mg/㎡ Day1
6	胃-外054;nab-PTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	ナブパクリタセル点滴静注用:260mg/㎡ Day1
7	胃-外058;S-1+CPT-11療法		中等度催吐性リスク	15	35	イリノテカン点滴静注液:80mg/㎡ Day1 Day15 S-1: 2 × 朝夕食後 21日分（day1夕食後～day22朝食後）
8	胃-外059;S-1+PTX療法_		軽度催吐性リスク	15	28	パクリタセル注:50mg/㎡ Day1 Day8 Day15 S-1: 2 × 朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
9	胃-外060;S-1+DTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注液:40mg/㎡ Day1 S-1: 2 × 朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
10	胃-外061;S-1+DTX療法(アルコール禁用)		軽度催吐性リスク	1	21	タキソール注（ドセタセル）:40mg/㎡ Day1 S-1: 2 × 朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
11	胃-外071;CPT-11療法		中等度催吐性リスク	1	14	イリノテカン点滴静注液:150mg/㎡ Day1
12	胃-外072;G-SOX療法_		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:100mg/㎡ Day1 S-1: 2 × 朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
13	胃-外075;【day1-14】RAM+PTX療法_	day1-14//28日毎	軽度催吐性リスク	8	14	パクリタセル注:80mg/㎡ Day1 Day8 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1
14	胃-外076;【day15-28】RAM+PTX療法_	day15-28//28日毎	軽度催吐性リスク	1	14	パクリタセル注:80mg/㎡ Day1 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1
15	胃-外077;RAM療法		最小度催吐性リスク	1	14	サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1
16	胃-外098;【進行再発】XELOX療法_		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 カベシタビン錠（2000mg/㎡/日）: 2 × 朝夕食後 14日分 （day1夕食後～day15朝食後）
17	胃-外099;【進行再発】XELOX療法(血管痛対応)_		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 カベシタビン錠（2000mg/㎡/日）: 2 × 朝夕食後 14日分 （day1夕食後～day15朝食後）
18	胃-外100;【術後補助】XELOX療法_	中等度催吐性リスク（特定薬剤）に準じる。アプレミント使用 ★最大8コース	中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 カベシタビン錠（2000mg/㎡/日）: 2 × 朝夕食後 14日分 （day1夕食後～day15朝食後）
19	胃-外101;【術後補助】XELOX療法(血管痛対応)_	中等度催吐性リスク（特定薬剤）に準じる。アプレミント使用 ★最大8コース	中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 カベシタビン錠（2000mg/㎡/日）: 2 × 朝夕食後 14日分 （day1夕食後～day15朝食後）
20	胃-外115;【初回】HER+XP(Cape.+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	トラスズマブ注 :8mg/kg Day1 シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1 カベシタビン錠（2000mg/㎡/日）: 2 × 朝夕食後 14日分 （day1夕食後～day15朝食後）

21	胃-外116;【2コース以降】HER+XP(Cape.+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	トラスツズマブ 注:6mg/kg Day1 シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1 カペシタビン錠（2000mg/㎡/日）:2×朝夕食後 14日分 （day1夕食後～day15朝食後）
22	胃-外117;【初回】HER+SP(S-1+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	トラスツズマブ 注:8mg/kg Day1 シスプラチン点滴静注:60mg/㎡ Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
23	胃-外118;【2コース以降】HER+SP(S-1+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	トラスツズマブ 注 :6mg/kg Day1 シスプラチン点滴静注:60mg/㎡ Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
24	胃-外119;【初回】HER+SOX(130)療法		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 トラスツズマブ 注:8mg/kg Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
25	胃-外120;【2コース以降】HER+SOX(130)療法		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 トラスツズマブ 注:6mg/kg Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
26	胃-外122;ニボルマブ療法		最小度催吐性リスク	1	14	オプジーボ 点滴静注:240mg Day1
27	胃-外131;G-SOX療法_（血管痛対応）		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:100mg/㎡ Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）
28	胃-外132;RAM+nab-PTX療法		軽度催吐性リスク	15	28	サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 アパシチン点滴静注用100mg:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15
29	胃-内018;ShortSP(S-1+CDDP)療法-Short Hydration-		高度催吐性リスク	8	35	シスプラチン点滴静注:60mg/㎡ Day8 S-1:2×朝夕食後 21日分（day1朝食後～day14夕食後）
30	胃-外141;mFOLFOX6療法_		中等度催吐性リスク	1	14	レボホリナート点滴静注用:200mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:400mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:2400mg/㎡ Day1
31	胃-外145;【初回】HER+Cape療法	※条件付きレジメン（HER+XP療法後の維持療法）	最小度催吐性リスク	1	21	トラスツズマブ 注 :8mg/kg Day1 カペシタビン錠（2000mg/㎡/日）:2×朝夕食後 14日分 （day1夕食後～day15朝食後）
32	胃-外146;【2コース以降】HER+Cape療法	※条件付きレジメン（HER+XP療法後の維持療法）	最小度催吐性リスク	1	21	トラスツズマブ 注:6mg/kg Day1 カペシタビン錠（2000mg/㎡/日）:2×朝夕食後 14日分 （day1夕食後～day15朝食後）