

| 【肺がん・胸腺がんレジメン】 |                                        |                                                       |           |      |       |                                                                                |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                | レジメン名                                  | コメント                                                  | 催吐リスク     | 投与期間 | コース期間 | 抗がん剤                                                                           |
| 1              | 胸腺-外097;CAP療法                          |                                                       | 高度催吐性リスク  | 1    | 21    | ドキシルビシ塩酸塩注射液:50mg/㎡ Day1<br>エンドキサン注:500mg/㎡ Day1<br>シスプラチン点滴静注:50mg/㎡ Day1     |
| 2              | 胸腺-内026;CBDCA(AUC6) + PTX療法_           |                                                       | 中等度催吐性リスク | 1    | 21    | パクリタセル注:200mg/㎡ Day1<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1                                |
| 3              | 肺-外001;CBDCA(AUC6)+PTX+Bmab療法_         |                                                       | 中等度催吐性リスク | 1    | 21    | カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1<br>パクリタセル注 :200mg/㎡ Day1<br>ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1 |
| 4              | 肺-外002;CBDCA(AUC5) + GEM療法_            |                                                       | 中等度催吐性リスク | 8    | 21    | ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/㎡ Day1 Day8<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1                      |
| 5              | 肺-外008;CBDCA(AUC5)+PEM療法               | ※葉酸とVitB12の投与を確認                                      | 中等度催吐性リスク | 1    | 21    | ペメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1                           |
| 6              | 肺-外055;BiweeklyCBDCA(AUC3)+PTX療法_      |                                                       | 中等度催吐性リスク | 15   | 28    | カルボプラチン点滴静注液:AUC=3 Day1 Day15<br>パクリタセル注:120mg/㎡ Day1 Day15                    |
| 7              | 肺-外065;NP(CDDP + VNR)療法                |                                                       | 高度催吐性リスク  | 8    | 21    | シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1<br>ロゼウス静注用:25mg/㎡ Day1 Day8                             |
| 8              | 肺-外066;weeklyCBDCA (AUC2)+PTX+RT療法_    | day1,8,15,22,29,36投与,休薬完了day63,放射線（60Gy/30回）終了後3週間の休薬 | 中等度催吐性リスク | 1    | 7     | カルボプラチン点滴静注液:AUC=2 Day1<br>パクリタセル注:40mg/㎡ Day1                                 |
| 9              | 肺-外067;weeklyVNR療法                     |                                                       | 最小度催吐性リスク | 1    | 7     | ロゼウス静注用:25mg/㎡ Day1                                                            |
| 10             | 肺-外068;IP(CDDP;60mg/㎡+CPT-11;60mg/㎡)療法 |                                                       | 高度催吐性リスク  | 15   | 28    | イリノテカン点滴静注液:60mg/㎡ Day1 Day8 Day15<br>シスプラチン点滴静注:60mg/㎡ Day1                   |
| 11             | 肺-外078;Bmab(15mg/kg) 維持療法              | ※維持療法で用いる                                             | 最小度催吐性リスク | 1    | 21    | ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1                                                     |
| 12             | 肺-外079;VNR+Bmab(15mg/kg) 療法            |                                                       | 最小度催吐性リスク | 8    | 21    | ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1<br>ロゼウス静注用:25mg/㎡ Day1 Day8                         |
| 13             | 肺-外090;GEM療法_                          |                                                       | 軽度催吐性リスク  | 15   | 28    | ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/㎡ Day1 Day8 Day15                                           |
| 14             | 肺-外108;DTX療法(アルコール禁用)                  |                                                       | 軽度催吐性リスク  | 1    | 21    | タキソール注（ドセタセル） :60mg/㎡ Day1                                                     |
| 15             | 肺-内001;AMR療法                           | ※注射でDEX3日間行くので、経口DEXは省略。                              | 中等度催吐性リスク | 3    | 28    | カルセド注射:40mg/㎡ Day1 Day2 Day3                                                   |
| 16             | 肺-内003;BiweeklyCBDCA(AUC3) + GEM療法_    |                                                       | 中等度催吐性リスク | 1    | 14    | ゲムシタビン点滴静注液:1000mg/㎡ Day1<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=3 Day1                           |
| 17             | 肺-内004;CBDCA(AUC6) + PTX療法_            |                                                       | 中等度催吐性リスク | 1    | 21    | パクリタセル注:200mg/㎡ Day1<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1                                |
| 18             | 肺-内005;CBDCA(AUC5) + S-1療法             |                                                       | 中等度催吐性リスク | 1    | 21    | カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1<br>S-1: 2 × 朝夕食後 14日分（day1夕食後～day15朝食後）                |
| 19             | 肺-内006;CBDCA(AUC5) + VP-16療法           |                                                       | 中等度催吐性リスク | 3    | 21    | エトポシド点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day2 Day3<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1                   |
| 20             | 肺-内007;PEM療法                           | ※葉酸とVitB12の投与を確認                                      | 軽度催吐性リスク  | 1    | 21    | ペメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1                                                      |

|    |                                           |                  |           |    |    |                                                                                          |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 肺-内008;CBDCA(AUC5)+PEM療法                  | ※葉酸とVitB12の投与を確認 | 中等度催吐性リスク | 1  | 21 | ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1                                     |
| 22 | 肺-内009;CBDCA(AUC6)+PEM+Bmab療法             | ※葉酸とVitB12の投与を確認 | 中等度催吐性リスク | 1  | 21 | ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1<br>ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1       |
| 23 | 肺-内012;weeklyPTX療法_                       |                  | 軽度催吐性リスク  | 15 | 28 | パ`クリタセル注:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15                                                          |
| 24 | 肺-内013;ハイカムチン療法                           |                  | 軽度催吐性リスク  | 5  | 21 | ハイカムチン注射用 1.1mg/V:1mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5                                         |
| 25 | 肺-内015;CPT-11療法                           |                  | 中等度催吐性リスク | 15 | 28 | イリノテカン点滴静注液:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15                                                      |
| 26 | 肺-内016;DTX療法                              |                  | 軽度催吐性リスク  | 1  | 21 | ドセタキセル点滴静注液:60mg/㎡ Day1                                                                  |
| 27 | 肺-内017;VNR療法(2投1休)                        |                  | 最小度催吐性リスク | 8  | 21 | ロゼウス静注用（レジメン用 規格なし）:25mg/㎡ Day1 Day8                                                     |
| 28 | 肺-内019;RAM+DTX療法                          |                  | 軽度催吐性リスク  | 1  | 21 | ドセタキセル点滴静注液:60mg/㎡ Day1<br>サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1                                       |
| 29 | 肺-内020;ニボルマブ療法                            |                  | 最小度催吐性リスク | 1  | 14 | オプジーボ`点滴静注:240mg Day1                                                                    |
| 30 | 肺-内021;CDDP+VP-16療法                       |                  | 高度催吐性リスク  | 1  | 21 | シスプラチン点滴静注:80mg/㎡ Day1<br>エトポシド`点滴静注液 :100mg/㎡ Day1 Day2 Day3                            |
| 31 | 肺-内022;CBDCA(AUC6)+nab-PTX療法              |                  | 中等度催吐性リスク | 15 | 21 | ア`ラキサン点滴静注用:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1                           |
| 32 | 肺-内023;ベムプロリズマブ療法                         |                  | 最小度催吐性リスク | 1  | 21 | キイトルーダ`点滴静注100mg4mL:200mg Day1                                                           |
| 33 | 肺-内024;weekly nab-PTX療法                   |                  | 軽度催吐性リスク  | 1  | 7  | ア`ラキサン点滴静注用:100mg/㎡ Day1                                                                 |
| 34 | 肺-内025;デュルバルマブ療法                          |                  | 最小度催吐性リスク | 1  | 14 | イミフィンジ点滴静注用:10mg/kg Day1                                                                 |
| 35 | 肺-内026;パ`ム7`ロイズ`マ7`+CBDCA(AUC5)+PEM療法     | ※葉酸とVitB12の投与を確認 | 中等度催吐性リスク | 1  | 21 | キイトルーダ`点滴静注:200mg Day1<br>ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1           |
| 36 | 肺-内027;パ`ム7`ロイズ`マ7`+PEM療法                 | ※葉酸とVitB12の投与を確認 | 軽度催吐性リスク  | 1  | 21 | キイトルーダ`点滴静注:200mg Day1<br>ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1                                      |
| 37 | 肺-内028;パ`ム7`ロイズ`マ7`+CBDCA(AUC6)+PTX療法_    |                  | 中等度催吐性リスク | 1  | 21 | パ`クリタセル注:200mg/㎡ Day1<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1<br>キイトルーダ`点滴静注:200mg Day1               |
| 38 | 肺-内029;パ`ム7`ロイズ`マ7`+CBDCA(AUC6)+nab-PTX療法 |                  | 中等度催吐性リスク | 15 | 21 | カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1<br>ア`ラキサン点滴静注用:100mg/㎡ Day1 Day8 Day15<br>キイトルーダ`点滴静注:200mg Day1 |
| 39 | 肺-内030;PEM+Bmab療法                         | ※葉酸とVitB12の投与を確認 | 軽度催吐性リスク  | 1  | 21 | ベメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1<br>ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/kg Day1                                  |
| 40 | 肺-内031;アテゾリズマブ+CBDCA(AUC5)+VP-16療法        |                  | 中等度催吐性リスク | 3  | 21 | テセントリク点滴静注:1200mg Day1<br>エトポシド`点滴静注液 :100mg/㎡ Day1 Day2 Day3<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1 |

|    |                                      |                                            |           |    |    |                                                                                |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 肺-内032;アテゾリズマブ療法                     |                                            | 最小度催吐性リスク | 1  | 21 | テセントリク点滴静注:1200mg Day1                                                         |
| 42 | 肺-内033;CDDP + PEM療法                  | ※葉酸とVitB12の投与を確認<br>※最大 6 コース              | 高度度催吐性リスク | 1  | 21 | ペメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1<br>シスプラチン点滴静注:75mg/㎡ Day1                            |
| 43 | 肺-内034;ペムブロリズマブ(6週間間隔)療法             |                                            | 最小度催吐性リスク | 1  | 42 | キイトルダ点滴静注100mg4mL:400mg Day1                                                   |
| 44 | 肺-内038;ニボルマブ+イピリムマブ療法                | ※ニボルマブ+イピリムマブ<br>+ 化学療法(6週毎)1コース終了<br>後に開始 | 最小度催吐性リスク | 22 | 42 | オプジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22<br>ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1                            |
| 45 | 肺-内040;RAM(10mg/kg)+エルロチニブ療法         |                                            | 最小度催吐性リスク | 1  | 14 | サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1<br>タルセバ錠 1日1回 (連日内服)                                   |
| 46 | 肺-内041;アテゾリズマブ + CBDCA(AUC6) + PEM療法 | ※葉酸とVitB12の投与を確認                           | 中等度催吐性リスク | 1  | 21 | テセントリク点滴静注:1200mg Day1<br>ペメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1<br>カルボプラチン点滴静注液:AUC=6 Day1 |
| 47 | 肺-内042;アテゾリズマブ + PEM療法               | ※葉酸とVitB12の投与を確認                           | 軽度催吐性リスク  | 1  | 21 | テセントリク点滴静注:1200mg Day1<br>ペメトレキセド点滴静注液:500mg/㎡ Day1                            |

※PEM投与時  
①バンビタン末 1g 1 × (初回投与 1 週間前から開始。PEM  
中止または終了する場合には、最終投与から22日目まで投  
与。)  
②VitB12 (初回投与 1 週間前までに1mgを筋肉内投与。以  
後 9 週ごとに投与。)