

【子宮・卵巣がんレジメン】

レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1 子宮肉腫-婦007;DG療法_		軽度催吐性リスク	8	21	ゲムシタビ>点滴静注液 :900mg/m ² Day1 Day8 ドセタキセル点滴静注液:100mg/m ² Day8
2 体/卵-婦010;weeklyPTX(80mg/m ²)療法_		軽度催吐性リスク	15	28	パクリタール注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15
3 体-婦001;AP(ADM+CDDP)療法_		高度催吐性リスク	1	21	シスプラチン点滴静注:50mg/m ² Day1 ドキシル注:50mg/m ² Day1
4 卵-婦004;CPT-11+MMC療法		中等度催吐性リスク	15	28	イリノテカン点滴静注液:120mg/m ² Day1 Day15 マイトマイシン:7mg/m ² Day1 マイトマイシン:7mg/m ² Day15
5 卵-婦005;CPT-11療法		中等度催吐性リスク	15	28	イリノテカン点滴静注液:100mg/m ² Day1 Day8 Day15
6 卵-婦011;トポテカン療法		軽度催吐性リスク	5	21	ハイカムチン注射用:1.5mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
7 卵-婦012;BiweeklyPTX(80mg/m ²)療法_		軽度催吐性リスク	1	14	パクリタール注:80mg/m ² Day1
8 卵-婦013;【7日設定】GEM療法_	7日設定//1コース28日(3投1休)★コース要チェック★ ※がん化学療法後に増悪した卵巣癌	軽度催吐性リスク	1	7	ゲムシタビ>点滴静注液:1000mg/m ² Day1
9 卵-婦015;weeklyPTX + Bmab療法_		軽度催吐性リスク	22	28	アバスチン点滴静注用:10mg/kg Day1 Day15 パクリタール注 :80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
10 卵-婦017;P L D療法		軽度催吐性リスク	1	28	ドキシル注:50mg/m ² Day1
11 絨毛-婦008;MTX療法		最小度催吐性リスク	5	14	メントレキセート注:0.4mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
12 胚-婦014;BEP療法	※BLMは最小度催吐性リスク。	高度催吐性リスク	15	21	ブレオ注射用:30mg Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注:20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点滴静注液:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
13 頸/体/卵-婦009;TC療法_		中等度催吐性リスク	1	21	パクリタール注:180mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
14 頸/卵-婦006;DC療法		中等度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注液:60mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
15 頸/卵-婦018;TC + Bmab療法_		中等度催吐性リスク	1	21	アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1 パクリタール注:180mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
16 頸/卵-婦人019;Bmab(15mg/kg)療法	※TC+Bmab療法後、7~22クール	最小度催吐性リスク	1	21	アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
17 頸-婦002;CCRT(CDDP+RT)療法	7日毎(放射線治療と同時に開始)5-6回投与	高度催吐性リスク	1	7	シスプラチン点滴静注:40mg/m ² Day1
18 頸-婦003;CDDP+CPT-11療法		高度催吐性リスク	15	28	シスプラチン点滴静注:60mg/m ² Day1 イリノテカン点滴静注液:60mg/m ² Day1 Day8 Day15
19 頸-婦016;TP(PTX+CDDP)療法_		高度催吐性リスク	2	21	パクリタール注:135mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:50mg/m ² Day2
20 子宮肉腫-婦020;DG療法_(アルコール不耐用)		軽度催吐性リスク	8	21	ゲムシタビ>点滴静注液 :900mg/m ² Day1 Day8 ドセタキセル注:100mg/m ² Day8
21 卵-婦021;P L D+Bmab療法		軽度催吐性リスク	15	28	ドキシル注:40mg/m ² Day1 ペバシズマブ点滴静注:10mg/Kg Day1,15

22	卵-婦022;NGT+Bmab療法		軽度催吐性リスク	5	21	ハイカムチン注射用:1.0mg/m ² Day1-5 ペバシズマブ点滴静注:15mg/Kg Day1
23	卵-婦023;TP(PTX+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	パクリタール注:180mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注:75mg/m ² Day1
24	頸-婦024;Pembrolizumab+TC+Bmab療法	6コースまで	中等度催吐性リスク	1	21	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1 パクリタール注:175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液:AUC=5 Day1
25	頸-婦025;Pembrolizumab+Bmab療法	導入治療含み35コースまで	中等度催吐性リスク	1	21	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1