

【胃がんレジメン】

	レジメン名	コメント	催吐リスク	投与期間	コース期間	抗がん剤
1	胃-外009;weeklyPTX療法_		軽度催吐性リスク	15	28	パクリタール注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
2	胃-外012;SP(S-1+CDDP)療法		高度催吐性リスク	8	35	シスプラチン点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day8 S-1:2×朝夕食後 21日分 (day1朝食後～day21夕食後)
3	胃-外014;XP(Cape.+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	シスプラチン点滴静注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタビン錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
4	胃-外038;CDDP(70mg/m <sup>2</sup> )+CPT-11(80mg/m <sup>2</sup> )療法		高度催吐性リスク	15	28	イリノテカン点滴静注:70mg/m <sup>2</sup> Day1 シスプラチン点滴静注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 イリノテカン点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day15
5	胃-外040;DTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day1
6	胃-外054;nab-PTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	アパタニチン点滴静注:260mg/m <sup>2</sup> Day1
7	胃-外058;S-1+CPT-11療法		中等度催吐性リスク	15	35	イリノテカン点滴静注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 S-1:2×朝夕食後 21日分 (day1夕食後～day22朝食後)
8	胃-外059;S-1+PTX療法_		軽度催吐性リスク	15	28	パクリタール注:50mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
9	胃-外060;S-1+DTX療法		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル点滴静注:40mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
10	胃-外061;S-1+DTX療法(アルコール禁)		軽度催吐性リスク	1	21	ドセタキセル注 (ドセタキセル):40mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
11	胃-外071;CPT-11療法		中等度催吐性リスク	1	14	イリノテカン点滴静注:150mg/m <sup>2</sup> Day1
12	胃-外072;G-SOX療法_		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注:100mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
13	胃-外075;【day1-14】RAM+PTX療法_	day1-14//28日毎	軽度催吐性リスク	8	14	パクリタール注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 サイラムザ点滴静注:8mg/kg Day1
14	胃-外076;【day15-28】RAM+PTX療法_	day15-28//28日毎	軽度催吐性リスク	1	14	パクリタール注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 サイラムザ点滴静注:8mg/kg Day1
15	胃-外077;RAM療法		最小度催吐性リスク	1	14	サイラムザ点滴静注:8mg/kg Day1
16	胃-外098;【進行再発】XELOX療法_		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタビン錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
17	胃-外099;【進行再発】XELOX療法(血管痛対応)_		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタビン錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
18	胃-外100;【術後補助】XELOX療法_	中等度催吐性リスク(特定薬剤)に準じる。アプレタクト使用 ★最大8コース	中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタビン錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
19	胃-外101;【術後補助】XELOX療法(血管痛対応)_	中等度催吐性リスク(特定薬剤)に準じる。アプレタクト使用 ★最大8コース	中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注:130mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタビン錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
20	胃-外115;【初回】HER+XP(Cape.+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	トラスツマブ注:8mg/kg Day1 シスプラチン点滴静注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタビン錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)

21	胃-外116;【2コース以降】HER+XP(Cape.+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	トラスツマブ注:6mg/kg Day1 シスプラチン点滴静注:80mg/m <sup>2</sup> Day1 カベシタピン錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
22	胃-外117;【初回】HER+SP(S-1+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	トラスツマブ注:8mg/kg Day1 シスプラチン点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
23	胃-外118;【2コース以降】HER+SP(S-1+CDDP)療法		高度催吐性リスク	1	21	トラスツマブ注:6mg/kg Day1 シスプラチン点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
24	胃-外119;【初回】HER+SOX(130)療法		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツマブ注:8mg/kg Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
25	胃-外120;【2コース以降】HER+SOX(130)療法		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 トラスツマブ注:6mg/kg Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
26	胃-外122;ニボルマブ療法		最小度催吐性リスク	1	14	アブジール点滴静注:240mg Day1
27	胃-外131;G-SOX療法_ (血管痛対応)		中等度催吐性リスク	1	21	オキサリプラチン点滴静注液:100mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
28	胃-外132;RAM+nab-PTX療法		軽度催吐性リスク	15	28	サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 アブジール点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15
29	胃-内018;ShortSP(S-1+CDDP)療法-Short Hydration-		高度催吐性リスク	8	35	シスプラチン点滴静注:60mg/m <sup>2</sup> Day8 S-1:2×朝夕食後 21日分 (day1朝食後～day14夕食後)
30	胃-外141;mFOLFOX6療法_		中等度催吐性リスク	1	14	レボホリナート点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1
31	胃-外145;【初回】HER+Cape療法	※条件付きレジメン (HER+XP療法後の維持療法)	最小度催吐性リスク	1	21	トラスツマブ注:8mg/kg Day1 カベシタピン錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
32	胃-外146;【2コース以降】HER+Cape療法	※条件付きレジメン (HER+XP療法後の維持療法)	最小度催吐性リスク	1	21	トラスツマブ注:6mg/kg Day1 カベシタピン錠 (2000mg/m <sup>2</sup> /日):2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
33	胃-外150;T-DXd(エンハーツ)療法		中等度催吐性リス (特定薬剤)	1	21	エンハーツ点滴静注用:6.4mg/kg Day1
34	胃-外151;ニボルマブ+SOX療法_		中等度催吐性リスク	1	21	アブジール点滴静注:360mg Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m <sup>2</sup> Day1 S-1:2×朝夕食後 14日分 (day1夕食後～day15朝食後)
35	胃-外152;ニボルマブ+mFOLFOX6療法_		中等度催吐性リスク	1	14	アブジール点滴静注:240mg Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m <sup>2</sup> Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:400mg/m <sup>2</sup> Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m <sup>2</sup> Day1